

ART. LVI.—*Monographia Chalciditum.* BY FRANCIS
WALKER.

(Continued from page 364.)

“——— the green myriads in the peopled grass.”

Family ENCYRTIDÆ.

GENUS ENCYRTUS, Dalman.

Antennæ 11-articulatæ,^a ad os insertæ: thorax antice angustatus, postice quadratus: prothorax et metathorax minima, vix conspicua: abdomen breve, basi latum; segmentum 1^{um}. magnum; sequentia breviora, subæqualia: pedes plerumque validi; femora recta; tibiæ simplices; tarsorum articuli 1°. ad 4^{um}. curtantes, 5^{us}. 4°. longior; unguis et pulvilli parvi; mesopedium tibiæ spinis armatae, tarsi lati ciliati: proalis nervus humeralis longus, cubitalis mediocris, ulnaris et radialis brevissimi.

Corpus punctatum, nitens, parce et breviter pubescens: caput transversum, mediocre, latitudine thoracis, antice convexum: oculi magni, subrotundi: ocelli in vertice triangulum fingentes, medius antepositus: antennæ clavatae, pubescentes, corporis dimidio longiores; articulus 1^{us}. fusiformis; 2^{us}. cyathiformis; 3^{us}. et sequentes breves, subcyathiformes, usque ad 8^{um}. latentes; clava ovata, articulo 8°. latior et plus duplo longior: mandibulæ tridentatae, subquadratae, non arcuatæ; dentes minimi, acuti: maxillæ longæ, subarcuatæ; laciniae acuminatae, intus lobatae; palpi 4-articulati, filiformes, articuli 1^{us}. 2^{us}. et 3^{us}. mediocres, 4^{us}. multo longior fusiformis: labium obconicum; ligula brevis, lata; palpi biarticulati, breves, validi: thorax ovatus, planus: parapsidum suturæ non conspicuae: paraptera supra convenientia: scutellum obconicum, apice subacuminatum: abdomen ovatum, planum, læve, glabrum, apice acuminatum et parce pubescens, thoracis longitudine: oviductus exertus; vaginæ pubescentes: metapedium femora et tibiæ lata: alæ angustæ. (*Cerchysius*, Westwood.)

Sp. 1. En. urocerus. Fem. *Viridis aut cyaneus, abdomen cupreum, antennæ nigræ, pedes flavi nigro et fusco varia, alæ limpidæ, proalæ fusco plerumque fasciatæ.*

^a Antennæ *E. Jugæo* 9-articulatae?

Encyrtus urocerus . *Dalman, Kongl. Vetens. Acad. Handl.*
förf är 1820, p. 368.

Cerchysius urocerus } *Westwood, Lond. and Edin. Phil. Mag.*
et stigmatical . } *and Journ. of Science, Third Series,*
I. 127.

Fem.—Læte viridis : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ nigræ ; articulus 1^{us}. viridis : mesothoracis epimera et metathorax cuprea : abdomen cupreum, basi viridi varium : oviductus fulvus ; vaginæ nigra, abdominis dimidio paullo longiores : pedes flavi ; coxae virides ; propedium femora nigra, tibiæ basi fuscæ, tarsi obscure fulvi ; mesopedium femora nigro-fusca basi et apice flava, tibiæ basi fusco-cinctæ, tarsi apice fusi ; metapedium femora et tibiæ nigra, tarsi apice nigro-fusci : alæ limpidae ; squamulæ et nervi nigro-fusca, stigma minutum concolor ; proalæ cuique apud stigma fascia postice abbreviata fusca. (Corp. long. lin. $\frac{5}{4}$ —1 $\frac{1}{4}$; alar. lin. 1—1 $\frac{1}{2}$.)

Var. β.—Mesotibiæ omnino flavæ.

Var. γ.—Abdomen basi læte viride : propedium tibiæ fuscæ, tarsi pallide fusi ; mesopedium femora nigra, tibiæ nigro-fuscæ.

Var. δ.—Thorax cyaneo-viridis : abdomen basi læte viride.

Var. ε.—Mesopedium femora et tibiæ flava, illâ basi fusca.

Var. ζ.—Proalis fasciæ perfectæ.

Var. η.—Mesothoracis scutum æneo-viride.

Var. θ.—Caput cyaneum : mesothoracis scutum et scutellum cyaneo-viridia : abdomen basi læte viride : mesotibiæ nigro-fuscæ : proalis fasciæ perfectæ.

Var. ι.—Proalæ immaculatae.

Var. κ.—Mesothoracis scutellum apice æneum : profemora supra fusco-vittata : proalæ immaculatae.

Var. λ.—Thorax omnino viridis : tarsi fusi, apice obscuriores.

Var. μ.—Caput et thorax cyanea : abdomen basi cyaneo-viride : protibiae nigræ : proalis fasciæ perfectæ.

June, July, September ; near London, Dorsetshire, Devonshire, Isle of Wight. Found at Port Marnock, Ireland, by Mr. Haliday.

Fem. — Corpus crassum, latum, convexum, nitens, punctatum, parce pubescens: caput transversum, thoracis latitudine, postice concavum; vertex angustus; frons convexa: oculi magni, non extantes: os velut *E. uroceri* formatum: antennæ crassæ, clavatae, pubescentes; articulus 1^{us}. fusiformis; 2^{us}. longicyathiformis; 3^{us}. et sequentes subquadrati, usque ad 8^{um}. curtantes et latescentes; clava longiovata, articulo 8°. paullo latior et plus duplo longior: thorax breviovatus; scutum transversum; paraptera non convenientia; scutellum rhombiforme: abdomen breviovatum, læve, supra planum, thorace paullo latius vix brevius: oviductus subexertus; vaginæ pubescentes; alæ angustæ.

Sp. 2. En. cyaneus. Fem. *Cyaneus viridi varius, abdomen viridi-cupreum, antennæ nigræ, pedes fulvi fusco-cincti, alis apices plerumque fuscæ.*

Encyrtus cyaneus . *Dalman, Kongl. Vetens. Acad. Handl. för år 1820; Nees ab Ess. Hym. Ich. affin. Monogr. II. 228.*

Caput nigrum, obscurum: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ, corporis dimidio longiores; articulus 1^{us}. fulvus, apice supra fuscus: scutum læte cyaneum: paraptera nigra, obscura: scutellum viride: metathorax nigro-cupreus: abdomen viride, nitens; discus cupreus: pedes fulvi; coxae virides; femora nigra, apice flava; tarsi apice obscuriores; metatibiae basi fuscæ; mesopodum tibiæ et tarsi flava, illæ basi fuscæ: alæ sublimpidæ, apice fuscæ; squamulæ et nervi fulva. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ —1; alar. lin. $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{3}$.)

Var. β. — Caput nigro-cyaneum: scutum cyaneo-viride: abdomen cupreum, basi cupreo-viride micans.

Var. γ. — *Var. β* similis: antennis articulus 1^{us}. nigro-fuscus, basi fulvus.

Var. δ. — Metatibiae fuscæ.

Var. ε. — *Var. δ* similis: cyaneus: abdomen cupreum, basi viride: proalæ omnino sublimpidæ, apud stigma fulvescentes.

Var. ζ. Immatura? *Var. ε* similis: antennæ nigro-fuscæ: alæ omnino limpidae; squamulæ et nervi flava.

Var. η. — Pedes fulvi; femora nigra; metatibiae fuscæ; mesotibiae fusco-cinctæ.

Var. θ.—*Var. ε* similis : caput nigro-cyaneum, antennæ nigro-fuscæ, articulus 1^{us}. fulvus : thorax cyaneo-viridis : scutum cyaneum : pedes fulvi; tarsi apice obscuriores ; metafemora fusca, apice fulva.

Var. ι.—Viridi-cyaneus : antennæ articulus 1^{us}. nigro-fuscus, basi flavus : abdomen cupreum, basi viride : pedes flavi; femora basi fusca ; tibiæ fusco-cinctæ ; tarsi apice fusci : protarsi fulvi; metapedium femora et tibiæ fusca : alæ fulvo-limpidæ.

June to October; on grass in fields; Windsor Forest, Hampshire, Isle of Wight, Cumberland, North Wales. Found by Mr. Haliday, near Belfast.

“Bred from a bundle of cocoons attached to a leaf, and covered with cottony yellow wool, like that which envelopes some spiders’ eggs.”—*Curtis’s British Entomology*, 395.

Mas.—Corpus breve, crassum, convexum, punctatum, nitens, parce pubescens : caput transversum, thorace paullo latius ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi majusculi : antennæ filiformes pubescentes, corpore paullo longiores ; articulus 1^{us}. fusiformis ; 2^{us}. cyathiformis, parvus ; 3^{us}. et sequentes longi, lineares, usque ad 8^{um}. paullulum curtantes ; clava fusiformis, articulo 8°. fere duplo longior : thorax ovatus : mesothoracis scutum transversum ; paraptera non convenientia ; scutellum brevi-obconicum : abdomen brevi-ovatum, planum, thorace brevius non augustius : alæ amplæ.

Sp. 3. En. Batillus. Mas. Viridis, abdomen cupreum, antennæ fulvæ, pedes flavi, metapedes fusci, alæ sublimpidæ.

Viridis : capitis vertex cupreo varius : frons læte viridis : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ pallide fulvæ, corporis longitudine ; articulus 1^{us}. læte flavus ; 2^{us}. supra basi fuscus : scutellum cupreο varium : abdomen nigro-cupreum : pedes flavi ; coxae virides ; tarsi fulvi ; metapedium femora et tibiæ fusca : alæ sublimpidæ, latae, corpore longiores ; squamulæ et nervi fulva. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$; alar. lin. $\frac{5}{4}$ —1.)

Var. β.—Tibiæ fulvo-cinctæ.

Var. γ.—Metafemora et metatibiæ nigro-fusca.

Var. δ.—Mesotarsi flavi apice fusci.

June, September; on grass in fields; near London, Berkshire, Wales, Devonshire.

Mas.—Corpus breve, crassum, punctatum, pubescens, nitens : caput transversum, convexum, postice concavum ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi magni : thorax ovatus, convexus ; mesothoracis scutum transversum, paraptera fere convenientia, scutellum rhombiforme : abdomen longi-obconicum supra planum, thorace paullo brevius et angustius : antennæ filiformes, hirtæ, corpore longiores ; articulus 1^{us}. fusiformis, gracilis ; 2^{us}. parvus, subrotundus ; 3^{us}. et sequentes longi, lineares, usque ad 8^{um}. paullulum curtantes ; clava fusiformis articulo 8°. multo longior vix latior : pedes longi, graciles.

Fem.—Antennæ subclavatae, corporis longitudine ; articulus 1^{us}. gracilis ; 2^{us}. longi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes usque ad 8^{um}. latescentes et curtantes ; clava longi-ovata, articulo 8°. latior et plus duplo longior : abdomen brevi-ovatum, subtus carinatum, thorace multo brevius vix angustius : oviductus occultus.

Sp. 4. En. Gabinius. *Mas* et *Fem.* *Viridis cupreo aut cyaneo varius, abdomen cupreum, antennæ nigræ aut fuscæ, pedes flavi fulvo et fusco varii, metapedes nigri, alæ limpidæ.*

Mas.—Læte viridis : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ fuscæ ; articulus 1^{us}. basi flavus : os fuscum : mesothoracis discus cupreο varius : metathorax cupreus : abdomen cupreum, basi læte viride : propedes fulvi, coxae femora et tibiae supra fusco-vittata ; mesopedes pallide flavi ; metapedes nigri, femora subarcuata, tibiae nigro-fuscæ basi et apice fulvae, tarsi pallide fusi : alæ limpidæ ; squamulæ fuscae ; nervi fulvi.

Var. β.—Mesothorax cyaneo-viridis : mesopedes flavi ; femora et tibiae fusco-cincta, tarsi fulvi basi flavi ; metapodum tibiae omnino nigro-fuscæ, tarsi fusi.

Var. γ.—Læte cyaneo-viridis : antennæ nigræ ; articulus 1^{us}. fuscus, basi et subtus pallide flavus : abdomen nigro-cupreum, basi læte viride : pedes flavi ; propedum femora et tibiae supra fulvo-vittata, tarsi fulvi ; mesopodum femora et tibiae basi fulva, tarsi apice fusi : metapedes nigri, genua et tarsi fusca.

Fem.—Antennæ nigro-fuscæ ; articulus 1^{us}. nigro-viridis : scutellum cupreum : abdomen cupreum, basi micans et viridi varium : tarsi fulvi, apice fusi ; propedum femora nigra apice flava, tibiae fuscae apice fulvae ; mesopedes flavi, femora fusco-cincta, tarsi pallidiores

apice fusti ; metafemora recta quam *mari* crassiora. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$; alar. lin. $\frac{5}{4}$ —1.)

May, September ; on grass in fields, near London. Found by Mr. Haliday in Ireland.

Fem.—Corpus sat longum, nitens, scite punctatum, brevissime pubescens : caput transversum, thorace paullo latius ; frons convexa : oculi magni : antennæ clavatae, hirtæ, corporis dimidio longiores ; articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis ; 2^{us}. longi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes subcyathiformes, usque ad 8^{um}. latescentes ; clava ovata, articulo 8°. latior et plus duplo longior : thorax ovatus, planus ; mesothoracis scutum transversum, paraptera non convenientia, scutellum brevissime obconicum : abdomen ovatum, planum, læve, subtus carinatum, apice parce hirtum, thorace paullo latius vix longius : oviductus subexertus : alæ angustæ.

Sp. 5. En. Marsus. Fem. *Viridi-cyaneus*, *abdomen cupreum*, *antennæ nigræ*, *pedes fuscæ*, *alæ subfuscæ*.

Viridi-cyaneus : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ nigræ ; articulus 1^{us}. fuscus, basi et subtus fulvus : abdomen cupreum, basi viridi varium : pedes fuscæ ; coxae virides ; femora et tibiae apice fulva ; pro- et meso-tibiae fulvæ, basi supra fuscæ, trochanteres et tarsi fulvi, hi apice fuscæ : alæ subfuscæ ; squamulæ et nervi fulva. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$; alar. lin. $\frac{5}{4}$.)

July ; on grass, in fields, near London.

Fem.—Corpus parvum, angustum, punctatum, pubescens, parum nitens : caput transversum, subquadratum, thoracis latitudine ; vertex angustus ; frons convexa, antice abrupte declivis : oculi magni, non extantes : antennæ clavatae, pubescentes, corporis dimidio longiores ; articulus 1^{us}. fusiformis ; 2^{us}. longi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes parvi, breves, usque ad 8^{um}. latescentes ; clava fusiformis, articulo 8°. latior et triplo longior : thorax ovatus ; mesothoracis scutum transversum, paraptera non convenientia, scutellum breve semicirculum fingens : abdomen ovatum, planum, apice angustum acuminatum, thorace vix brevius : oviductus occultus : pedes graciles : alæ angustæ.

Sp. 6. En. argentifer. (Haliday MSS.) Fem. *Viridis*, *sericeus*, *alarum basi ferrugineus*, *abdomen cupreum*, *antennæ fuscæ flavo cinctæ*, *pedes fusco-flavi*, *proalæ fuscæ basi limpidae*.

Viridis : oculi et ocelli obscure rufi : antennis articulus 1^{us}. fuscus, apice flavus ; 2^{us}. et 3^{us}. fusti ; 4^{us}. et 5^{us}. flavi ; 6^{us}. et sequentes nigro-fusti : scutum albo-sericeum : humeri et paraptera ferruginea : scutellum nigrum, obscurum metathorax æneo-viridis, micans : abdomen læte cupreum, basi viridi varium : pedes læte flavi ; mesofemora apice fulvo-cincta ; metapedum femora et tibiæ fusca, basi hæ apice quoque flava : proalæ fuscæ, basi limpidæ ; squamulæ et nervi fulva, hi apice fusti ; metalæ limpidæ. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$; alar. lin. $\frac{1}{2}$.)

Found in the Isle of Arran, by Mr. Haliday.

Fem.—Corpus breve, crassum, punctatum, pubescens, parum nitens : caput subrotundum, thorace paullo latius ; vertex latus ; frons convexa, ad os abrupte declivis : oculi sat magni, non extantes : antennæ clavatae, graciles, subcylindricæ, corpore vix breviores ; articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis ; 2^{us}. longi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes breves, subquadrati, usque ad 8^{um}. latescentes ; clava fusiformis, articulo 8°. paullo latior et triplo longior : thorax ovatus, convexus ; mesothoracis scutum transversum, paraptera non convenientia, scutellum obconicum : abdomen brevi-ovatum, planum, subtus carinatum, apice acuminatum, thorace paullo brevius et angustius : oviductus non exertus : pedes longi, graciles : alæ vix ullæ.

Sp. 7. En. Sipylus. Fem. *Nigro-æneus ferrugineo varius, antennæ nigrae, pedes fulvi, alæ limpidæ.*

Nigro-æneus : caput nigro-viride : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ nigrae ; articulus 1^{us}. basi et apice fuscus : humeri ferruginei : abdomen æneo-fuscum, basi ferrugineum : oviductus vaginæ nigrae : pedes fulvi ; tarsi flavi, apice pallide fusi : alæ limpidæ, mutilatæ. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$.)

Var. β.—Abdomen basi fuscum : metapedes pallide fusi ; tarsi fulvi, apice fusi.

October, on grass in fields, near London.

Mas.—Corpus parvum, angustum, pubescens, nitens, scitissime punctatum : caput transversum, subquadratum, thorace latius ; vertex latus, convexus ; frons convexa : oculi mediocres, non extantes : antennæ filiformes, pilosæ, corpore longiores ; articulus 1^{us}. fusiformis ; 2^{us}. longi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes ad 8^{um}. longi, lineares, subæquales ; clava fusiformis, acuminata, articulo 8°. multo longior : thorax ovatus ; mesothoracis scutum vix latius

quam longum, paraptera non convenientia, scutellum brevi-obconicum: abdomen ovatum, planum, lœve, fere glabrum, apice hirtum, thorace paullo brevius et angustius: sexualia occulta: pedes longi, graciles; mesotarsi parum incrassati: alæ vix ullæ.

Sp. 8. En. Comara. Mas. *Aeneo-viridis, abdomen cupreum, antennæ fulvæ, pedes flavi.*

Aeneo-viridis: oculi et ocelli picei: antennæ fulvæ; articulus 1^{us}. flavus: abdomen cupreum: pedes flavi; metafemora fusca, apice flava: alæ limpidæ, brevissimæ, volatu ineptæ. (Corp. long. lin. $\frac{1}{3}$.)

Var. β.—Caput et thorax cyaneo-viridia, illius vertex æneo-viridis.

Found near London; also in Ireland, by Mr. Haliday.

Fem.—Corpus angustum, punctatum, pubescens, parum nitens: caput transversum, convexum, thoracis latitudine; vertex angustus; frons convexa, ad os abrupte declivis: oculi magni: antennæ clavatae, corpore breviores; articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis; 2^{us}. longi-cyathiformis; 3^{us}. et sequentes transversi, subquadrati, usque ad 8^{us}. latescentes; clava longiovata, articulo 8^o. paullo latior et plus triplo longior: thorax ovatus, planus; mesothoracis scutum transversum, paraptera non convenientia, scutellum breve rhombiforme: abdomen ovatum, planum, thorace paullo angustius non longius: oviductus occultus: pedes validi: alæ angustæ.

Sp. 9. En. Paralia. Fem. *Nigro-piceus fulvo varius, abdomen cupreum, antennæ nigrae albo cinctæ, pedes fusco-flavi, proalæ fuscae basi limpidæ.*

Caput nigrum, obscurum: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ nigrae, articulus 1^{us}. fulvus, basi supra fuscus; 2^{us}. nigro-fuscus; 3^{us}. pallidior, apice albido; 4^{us}. et 5^{us}. albidi: thorax nigro-piceus, parum nitens, antice et utrinque fulvus; paraptera et scutellum fulva: abdomen nigro-cupreum, basi cupreo-viride micans: pedes flavi; femora fusca, basi et apice flava; metatibiæ fuscae, basi et apice flavæ: proalæ fuscae, basi limpidæ; metalæ limpidæ; squamulæ et nervi fulva, hi apud stigma fusci. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$; alar lin. $\frac{2}{3}$ —1.)

July; south of France.

Fem.—Corpus breve, crassum, latum, punctatum, pubescens, parum nitens: caput transversum, vix thoracis latitudine, antice subproductum et semicirculum fingens: oculi magni, non extantes:

antennæ clavatae, crassæ, pubescentes, corporis dimidio longiores; articulus 1^{us}. fusiformis, subtus dilatatus; 2^{us}. longi-cyathiformis; 3^{us}. et sequentes breves, transversi, usque ad 8^{us}. latescentes; clava longiovata, articulo 8°. paullo latior et triplo fere longior: thorax ovatus, convexus; scutum transversum, paraptera non convenientia, scutellum subrotundum: abdomen rotundum, supra planum, thorace brevius et latius: metatibiæ subarcuatae.

Sp. 10. En. barbarus. Fem. *Nigro-cyaneus*, *abdomen cupreum*, *antennæ fuscae albo cinctæ apice nigrae*, *pedes fulvi*, *alæ fulvae*.

Encyrtus barbarus. *Dalman, Kongl. Vetens. Acad. Handl. för är*, 1820; *Nees ab Ess. Hym. Ich. affin. Monogr. II. 211.*

Nigro-cyaneus: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ fuscæ; articulus 1^{us}. niger; 7^{us}. et 8^{us}. albidi; clava nigra: abdomen cupreum, nitens, læve, fere glabrum: pedes fulvi; tarsi flavi, apice fuscæ; mesopedes flavi: alæ limpidæ, breves, angustæ, apice subfuscæ; squamulæ et nervi fulva; stigma minutum; proalæ cuique apud stigma fascia lata fulva. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$; alar. lin. $\frac{5}{4}$ —1.)

Var. β.—Antennis articuli 5^{us}. et 6^{us}. nigro-fusci.

August, September; near London, North Wales, Scotland.
Found at Holywood, Ireland, by Mr. Haliday.

Sp. 11. En. Zarina. Fem. *Cyaneus*, *abdomen cupreum*, *antennæ fusco-fulvæ*, *pedes fulvi*, *alæ brevissimæ*.

Læte cyaneus: caput viride: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ fusco-fulvæ; articulus 1^{us}. fulvus; clava fusca: abdomen cupreum: pedes fulvi; mesopedes flavi, tarsi apice fulvi: alæ sublimpidæ, mutilatæ. (Corp. long. lin. $\frac{3}{4}$.)

Found in Ireland, by Mr. Haliday.

Sp. 12. En. ænei-ventris (Hal. MSS.) Fem. *Fulvus*, *abdomen viridi-cupreum*, *antennæ nigrae*, *pedes fulvi*, *alæ brevissimæ*.

Læte fulvus: oculi et ocelli picei: antennæ nigrae, pubescentes; articulus 1^{us}. fulvus: scuti discus viridescens; abdomen viridi-cupreum; pedes læte fulvi; tarsi apice obscuriores: mesopedes flavi: alæ limpidæ, mutilatæ, brevissimæ. (Corp. long. lin. $\frac{3}{4}$.)

Var. β.—Scutum omnino fulvum.

Found on heathy hills, in the Isle of Bute, by Mr. Haliday.

Fem.—Corpus breve, latum, crassum, pubescens, scitissime punctatum, parum nitens: caput semicirculum fingens thoracis latitudine; vertex latus; frons convexa, antice abrupte declivis: antennæ clavatae, pubescentes, corporis dimidio longiores; articulus 1^{us}. maxime dilatatus; 2^{us}. longi-cyathiformis; 3^{us}. et sequentes transversi, brevissimi, usque ad 8^{um}. latescentes; clava brevi-ovata, articulo 8°. latior et plus duplo longior: thorax breviconicus, planus; mesothoracis scutum transversum, paraptera non convenientia, scutellum subrhombiforme: abdomen subrotundum, supra planum, thorace latius et brevius: oviductus occultus: alæ parvæ aut nullæ.

Sp. 13. En. Jalysus. Fem. Fulvus, abdomen nigro-cupreum, antennæ nigræ, pedes fulvi, alæ nullæ.

Obscure fulvus: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ: abdomen nigro-cupreum, nitens: pedes fulvi; metafemora fusca; tarsi flavi, apice fusci. (Corp. long. lin. $\frac{2}{5}$.)

September; on Skiddaw, Cumberland.

Fem.—Niger: oculi et ocelli picei: antennæ nigræ, pubescentes; articulus 1^{us}. ater, nitens: abdomen æneo-atrum, nitens, læve, fere glabrum, apice quasi truncatum: pedes fulvi; tarsi apice obscuriores; coxae nigræ; propedum femora nigro-fusca apice basique flava, tibiae basi fuscae; metapedum femora nigra, tibiæ nigro-fuscae: alæ sublimpidae, angustæ, brevissimæ; proalæ cuique apud stigma fascia lata fusca; squamulæ et nervi fusca.

Mas.—Antennæ submoniliformes, extrorsum crassiores, corporis longitudine; articulus 1^{us}. fusiformis, non dilatatus; 2^{us}. parvus, ovatus; 3^{us}. et sequentes sublineares, usque ad 8^{um}. curtantes vix latescentes; clava longiovata, articulo 8°. multo longior vix latior: abdomen quam *fem.* brevius; segmentum 1^{um}. ejus dorsum fere totum occupans.

Sp. 14. En. Madyes. Fem. Niger, abdomen æneo-atrum, antennæ mari fuscæ fem. nigræ, pedes nigro-fusci, fem. alæ fusco fasciatæ.

Antennæ fuscæ: pro- et mesopедum femora nigro-fusca, basi et apice nigra; tibiæ basi fuscæ; alæ mutilatæ, vix conspicuae. (Corp. long. lin. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$.)

Found on the *Arbutus Uva Ursi*, on the top of Goatfell, in the Isle of Arran, by Mr. Haliday.

Mas.—Corpus parvum, nitens, scitissime squameum, fere glabrum : caput longitudine latius et in ea thoraci æquum ; vertex angustus ; frons abrupte declivis : oculi sat magni : antennæ gracillimæ, extrosum crassiores, corpore paullo breviores ; articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis ; 2^{us}. longi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes longi, lineares, usque ad 8^{um}. paullulum curtantes et latescentes ; clava fusiformis, acuminata, articulo 8°. triplo longior vix latior : thorax ovatus, planus ; mesothoracis scutum transversum ; paraptera supra convenientia ; scutellum rhombiforme, postice subproductum : abdomen ovatum, planum, ac si thorax longum et latum : sexualia subexerta.

Fem.—Antennis clava quam *mari* longior et latior : abdomen longiovatum, thorace paullo longius : oviductus subexertus.

Sp. 15. En. Imandes. *Mas et Fem.* *Cyaneus, abdomen nigro-cupreum, antennæ fuscæ, pedes flavo-fusci, femora nigra, alæ subfuscæ.*

Cyaneus : caput nigrum : os flavum : palpi fuscæ : oculi et ocelli picei : antennæ *mari* fuscæ, *fem.* nigro-fuscæ ; articulus 1^{us}. niger : abdomen nigro-cupreum : sexualia fuscæ : pedes nigri ; tibiæ flavæ, basi fuscæ ; tarsi fulvi ; metatibiæ nigro-fuscæ, apice flavæ : alæ subfuscæ ; squamulæ et nervi fuscæ. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$; alar. lin. $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$.)

Var. β.—*Mas* metatibiæ fulvæ, basi fuscæ.

Var. γ.—*Fem.* thorax purpureo-cyaneus.

July ; on grass in woods, near London.

Fem.—Corpus crassum, squameum, nitens, pubescens : caput convexum longitudine latius et in ea thoraci æquum ; vertex latus ; frons subimpressa, abrupte declivis : oculi mediocres : antennæ subclavatae, graciles, corporis dimidio paullo longiores ; articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis ; 2^{us}. longicyathiformis ; 3^{us}. et sequentes parvi, transversi, subcyathiformes, usque ad 8^{um}. latescentes ; clava fusiformis, acuminata, articulo 8°. plus quadruplo longior : thorax brevi-ovatus, planus ; mesothoracis scutum transversum ; paraptera non convenientia ; scutellum rhombiforme : abdomen ovatum, planum, thorace paullo latius non longius : oviductus occultus : pedes graciles.

Sp. 16. En. Chærilus. Fem. *Æneo-viridis*, *abdomen nigro-cupreum*, *antennæ nigræ*, *pedes fusci*, *alæ subfuscæ*.

Æneo-viridis: oculi et ocelli rufi : antennæ nigræ ; articulus 1^{us}. nigro-viridis : abdomen nigro-cupreum : pedes fusci ; genua fulva ; tarsi flavi, apice fusci : alæ subfuscæ ; squamulæ et nervi fusca. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$; alar. lin. $\frac{3}{4}$)

September; roots of grass, sandhills, North Wales.

Fem.—Corpus breve, latum, crassum, punctatum, obscurum, albo-hirtum : caput magnum, brevissimum, non aliter thorace latum, ad os abrupte declivis : mandibulæ bidentatae, angustæ, arcuatæ ; dentes acuti, subæquales : maxillæ longæ, subarcuatæ ; laciniæ acuminatae, intus dilatatae ; palpi filiformes, graciles, articulus 2^{us}. 1°. longior, 3^{us}. adhuc longior, 4^{us}. fusiformis 3°. longior : labium angustum, obconicum ; ligula brevis, lata, conica : palpi biarticulati, breves, subfiliformes ; antennæ extrorsum crassiores, corpore paullo breviores ; articulus 1^{us}. longissimus, fusiformis, subtus dilatatus ; 2^{us}. longi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes longi, sublineares, usque ad 8^{us}. curtantes et paullo latescentes ; clava fusiformis, articulo 8°. duplo longior et paullo latior : thorax sub-quadratus, convexus : mesothorax dorsum omne occupans ; segmenta maxima ; parapsidum suturæ non conspicuæ ; paraptera supra non convenientia ; scutellum rhombiforme ; pectoris laminæ maximæ : abdomen planum, subtus carinatum, apice compressum et acuminatum ; segmentum 1^{us}. maximum : segmenta ventralia occulta : oviductus non exertus : pedes validi.

Mas.—Corpus quam fem. angustius : caput antice convexum : antennæ filiformes, corporis longitudine ; articulus 1^{us}. non dilatatus ; 2^{us}. cyathiformes ; 3^{us}. et sequentes ad 8^{us}. curtantes ; clava articulo 8°. multo longior : abdomen ovatum, subtus convexum, thorace brevius.

Sp. 17. En. hemipterus. Mas et Fem. *Nigro-æneus*, *antennæ nigræ*, *tarsi et mari mesopedes pallidi*, *alæ bifasciatæ aut vix ullæ*.

Encyrtus hemipterus . *Dalman, Kongl. Vetens. Acad. Handl. för är, 1820; Nees ab Ess. Hym. Ich. affin. Monogr. II. 252.*

Nigro-æneus, obscurus, unicolor : oculi et ocelli obscure rufi : palpi flavi, apice fusci : antennæ nigræ, brevissime pubescentes ; articulus 1^{us}. nigro-æneus ; clava apice fusca : trophi flavi : pectoris

laminæ nigro-cyanæ : pedes nigro-aenei ; genua et protarsi fusca ; meso- et metatarsi flavi, apice fusi : alæ fuscae, mutilatae, subcoriaceæ. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{5}{4}$; alar. lin. 1.)

Mas.—Abdomen cupreum : tarsi fusi : mesopedes fulvi, femora fusca.

Var. β.—*Fem.* protarsi fulvi.

Var. γ.—*Fem.* caput et thorax nigro-viridia.

Var. δ.—*Fem.* alæ perfectæ, fuscae ; squamulæ et nervi obscuriora, horum cubitalis crassus ; proalæ cujusque fasciæ 2, apicalis lunata alba ; metalæ sublimpidæ.

June, September; on ferns; Hampshire, Isle of Wight, Wales, Cumberland, Dorsetshire, Devonshire, Cornwall, Ireland, Auvergne.

Fem.—Corpus crassum, latum, nitens, glabrum, scitissime punctatum : caput brevissimum, thoracis latitudine ; vertex latus, convexus ; frons abrupte declivis : oculi mediocres : antennæ extrorsum crassiores, corpore vix breviores ; articulus 1^{us}. longissimus, gracilis, subfusiformis ; 2^{us}. longus, linearis, 3^{us}. et sequentes longi, linearis, usque ad 8^{um}. paullulum latescentes et curtantes ; clava longi-ovata, articulo 8°. duplo fere longior vix latior : thorax oblongus, subquadratus, convexus : prothorax supra conspicuus : mesothoracis scutum breve, transversum ; paraptera magna, supra convenientia ; scutellum rhombiforme : metathorax sat bene determinatus : abdomen ovatum, supra planum, subtus carinatum, basi latum, apice angustum et acuminatum : alæ angustæ.

Sp. 18. En. Lindus. Fem. *Cyaneo-fulvus, antennæ fuscae apice flavæ, pedes fulvi, alæ subfuscæ aut nullæ.*

Fulvus : capitis vertex et thoracis discus cyaneo-fusca : oculi et ocelli rufi : antennæ fuscae ; articulus 1^{us}. fulvus ; 2^{us}. basi et subtus fulvus ; clava pallide flava, basi fusca : abdominis discus cyaneo-fuscus : pedes fulvi ; tarsi flavi, apice fusi ; protarsi obscure fulvi ; metapedum femora et tibiae supra fusca : alæ subfuscæ ; squamulæ et nervi fusca ; proalæ cujusque apicem versus fascia lunata alba. (Corp. long. lin. $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$; alar. 1 $\frac{1}{4}$.)

Var. β.—Antennis articulus 1^{us}. supra apice fuscus ; 3^{us}. et sequentes ad 9^{um}. nigro-fusci : alæ nullæ.

June ; on chalk downs, Isle of Wight.

Fem.—Corpus angustum, scitissime squameum, parce et breviter pubescens: caput breve, antice convexum, thorace paullo angustius: antennæ gracillimæ, fere filiformes, corpore longiores; articulus 1^{us}. longissimus, gracilis, linearis; 2^{us}. longi-cyathiformis; 3^{us}. et sequentes ad 8^{um}. longi, lineares; clava longissima, linearis, articulo 8°. paullo latior et plus duplo longior: thorax ovatus, subconvexus: mesothoracis scutum longitudine latius; parapsidum suturæ non conspicuæ; paraptera supra non convenientia; scutellum subrhombiforme: abdomen lœve, planum, subitus carinatum, apice compressum et acuminatum, thoracis longitudine at eodem multo angustius: oviductus subexertus: pedes longi, gracieles: alæ angustæ.

Sp. 19. En. *Anceus*. Fem. *Viridis sericeus, abdomen cupreo-aeneum, antennæ nigræ, pedes flavi, alæ limpidæ*.

Læte viridis, quasi sericeus: oculi et ocelli rufi: antennæ nigræ, vix pubescentes: abdomen cupreo-aeneum, nitens, glabrum, apice parce pubescens: oviductus vaginæ, nigræ, pubescentes: pedes læte flavi; tarsi apice fusi: alæ limpidæ; squamulæ et nervi fulva. (Corp. long. lin. $\frac{3}{4}$; alar. lin. $1\frac{1}{4}$.)

Var. β.—Metapedum femora et tibiæ fusco fasciata.

July, September; on laurustinus and ivy, near London, North Wales.

Sp. 20. En. *Didius*. Fem. *Viridis aut cupreus, sericeus, antennæ nigræ aut fuscæ, pedes flavi, mesopedes nigri, alæ limpidæ*.

Læte viridis, sericeus: capitis vertex viridi-aeneus: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ nigræ; articulus 1^{us}. nigro-viridis, apice fuscus; 2^{us}. apice fuscus: humeri albi: mesothoracis scutum antice cupreum; scutellum obscure cupreum: metathorax aeneus: abdomen cupreum, basi viride, apice parce pubescens: oviductus vaginæ nigræ, pubescentes: pedes pallide flavi; coxæ virides; tarsi apice fulvi; propedum femora et tibiæ extus fulvo vittata, tarsi fulvi; metapedum femora et tibiæ nigra apice basique flava, tarsi apice fusi: alæ limpidæ; squamulæ et nervi pallide fusca. (Corp. long. lin. $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$; alar. lin. $\frac{5}{4}$ —1.)

Var. β.—Mesopedum femora basi fusca; tibiæ fuscæ, basi et apice flavæ.

Var. γ.—*Var. β* similis: antennæ fuscæ; articulus 1^{us}. viridis; 2^{us}. niger.

Var. ð.—Caput et thorax cupreo-aenea.

Var. ε.—Caput viride: thorax æneo-viridis, cupreo varius.

July to September; on grass in fields, near London; Devonshire.

Mas.—Corpus angustum, sublineare, nitens, scite punctatum, pubescens: caput breve, transversum, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres: thorax longiovatus, fere planus: mesothoracis scutum latitudine paullo longius; paraptera fere convenientia; scutellum brevi-obconicum: abdomen ovatum, planum, lœve, fere glabrum, thorace brevius vix angustius, apice hirtum: antennæ longæ, filiformes, pilosæ; articulus 1^{us}. fusiformis; 2^{us}. subrotundus, parvus; 3^{us}. et sequentes longi, æquales, sublineares; clava fusiformis, acuminata, articulo 8°. multo longior non latior.

Sp. 21. En. melanopus (Haliday MSS.) *Mas. Viridis, abdomen cupreum, antennæ fuscae, pedes nigro-fusci, mesopedes flavi, alæ limpidæ.*

Læte viridis: oculi et ocelli obscure rufi: antennæ fuscae, subtus fulvæ, corpore vix breviores; articulus 1^{us}. flavus, subdilatatus, supra apicem versus niger; 2^{us}. supra nigro-fuscus: humeri læte flavi: abdomen cupreum, basi et utrinque viride: sexualia flava: pro- et metapodium femora et coxae viridia, illa apice fulva; tibiæ nigro-fuscæ, subtus pallidiores, apice fulvæ; tarsi pallide fusi: mesopedes flavi; tibiæ basi et tarsi apice fusca: alæ limpidæ; squamulæ et nervi pallide fusca. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ —1; alar. lin. 1—1 $\frac{1}{4}$)

Var. β.—Antennis articulus 1^{us}. nigro-viridis; 2^{us}. nigro-fuscus: propedes fusi, femora fulva supra viridi vittata, tibiæ supra et apice fulvæ; mesotibiæ omnino flavæ; metapodium tibiæ nigræ, tarsi fusi basi flavi.

July, October; near London. Found in August on the coast near Belfast, by Mr. Haliday.

Sp. 22. En. subplanus. *Mas. Præcedenti similis at angustior, antennæ longiores graciliores fulvæ.*

Encyrtus subplanus. *Dalman, Kongl. Vetens. Acad. Handl. för är, 1820; Nees ab Ess. Hym. Ich. affin. Monogr. II. 245.*

Mas.—Læte viridis, micans: oculi et ocelli rufi: antennæ fulvæ,
NO. V. VOL. IV. 3 N

corporis longitudine ; artieuli 1^{us}. et 2^{us}. supra virides : humeri lœte flavi : abdomen cupreum, basi viridi-cyanum : pedes lœte flavi ; coxae virides ; tarsi apice fusi ; propedum femora basi nigra, tibiæ extus fusco vittatae, tarsi fulvi ; mesopedum femora fulva apice flava, tibiæ basi supra fusco maculatae ; metapедum femora et tibiæ nigra, tarsi fusi basi flavi : alæ limpidae ; squamulae et nervi fulva, hi apice fusi. (Corp. long. lin. $\frac{3}{4}$ —1 ; alar. lin. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$.)

May, September ; on grass in fields, near London, Wales, Isle of Wight.

Sp. 23. En. Gellius. Mas. E. subplano *adhuc gracilior multoque minor*.

Viridis, quasi sericeus : capit vertex viridi-aeneus : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ fulvæ, corporis longitudine ; articulus 1^{us}. viridis, basi et apice flavus ; 2^{us}. basi fuscus : mesothoracis scutum antice cupreum ; scutellum obscure cupreum : metathorax aeneus : abdomen cupreum, basi viride : pedes pallide flavi ; coxae virides ; tarsi apice fulvi ; propedum femora et tibiæ extus fulvo vittata, tarsi fulvi ; mesopedum femora basi fusca, tibiæ fuscae basi et apice flavæ ; metapедum femora et tibiæ nigra apice basique flava, tarsi apice fusi : alæ limpidae ; squamulae et nervi pallide fusca : alæ limpidae ; squamulae et nervi pallide fusca. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$; alar. lin. $\frac{5}{4}$.)

September ; on grass in fields ; near London.

Mas.—Corpus longum, sublineare, nitens, scite punctatum, brevisime pubescens : caput transversum, convexum, subquadratum, latitudine thoraci æquum ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi mediocres : antennæ graciles, filiformes, pilosæ aut pubescentes, corpore paullo longiores ; articulus 1^{us}. fusiformis ; 2^{us}. subrotundus ; 3^{us}. et sequentes longi, lineares, discreti, usque ad 8^{us}. paullulum curtantes ; clava fusiformis, acuminata, articulo 8°. multo longior : thorax ovatus, planus : mesothoracis scutum vix latius quam longum ; paraptera fere convenientia ; scutellum obconicum : abdomen ovatum, planum, thorace paullo brevius et angustius : alæ amplæ.

Sp. 24. En. Glaphyra. Mas. *Viridis aeno et cyaneo varius, abdomen cupreum, antennæ nigræ aut fuscæ pilosæ, pedes nigro-fuscæ, tarsi flavi, alæ sublimpidae*.

Viridis : caput aeno-varium : oculi et ocelli picci : antennæ nigræ ;

articulus 1^{us}. nigro-viridis: abdomen cupreum, basi micans: coxae et femora nigro-viridia; tarsi flavi, apice fusi; meso- et metatibiæ nigro-fuscæ, basi albidae, apice flavæ; protibiæ et protarsi pallide fusca: alæ sublimpidæ; squamulæ et nervi fusca. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{5}{4}$; alar. lin. $\frac{3}{4}$ —1.)

Var. β.—Femora nigro-fusca, apice flava; tibiæ pallidiores; protibiæ flavæ, basi supra fuscae.

Var. γ.—Thorax æneo-viridis.

Var. δ.—Caput et thorax cyaneo-viridia.

Var. ε.—*Var. β* similis: mesotibiæ flavæ, fusco cinctæ.

Var. ζ.—Antennæ nigro-fuscæ.

Var. η.—Metapedum tibiæ nigræ, basi et apice pallide flavæ; tarsi fulvi, apice fusi.

Var. θ.—Antennæ articuli 3°. ad 11^{am}. pallide fusi.

May to September; on grass in fields; near London, Berkshire, Isle of Wight, Dorsetshire, &c.

Sp. 25. En. Mattinus. Mas. *Cyaneo-viridis, abdomen cupreum, antennæ fuscæ pubescentes, pedes fusco-fulvi, metapedes nigri, alæ sublimpidæ.*

Mas.—Cyaneo-viridis: capitis frons lâte viridis: oculi et ocelli picei: palpi fusi: antennæ fuscæ; articulus 1^{us}. flavus, apice supra fuscus: abdomen cupreum, basi cyaneum: pedes fulvi; coxae virides; femora et tibiæ pallide fusca, basi et apice fulva; metapedum femora et tibiæ nigra: alæ sublimpidæ, latæ. (Corp. long. lin. $\frac{2}{3}$; alar. lin. 1.)

Var. β.—Profemora flava.

May, September; on grass in fields; near London, Hampshire.

Mas.—Corpus longum, lineare, punctatum, subnitens, parce et breviter pubescens: caput brevissimum, convexum, thoracis latitudine; vertex latus; frons abrupte declivis: oculi mediocres: antennæ subfiliformes, planæ, pubescentes, corpore vix breviores; articulus 1^{us}. fusiformis, gracilis; 2^{us}. subrotundus; 3^{us}. et sequentes longi, lineares, usque ad 8^{am}. paullulum curtantes; clava fusiformis, articulo 8°. plus dimidio longior: thorax ovatus, convexus; mesothoracis scutum longitudine vix latius; paraptera non convenientia; scutellum obconicum, basi utrinque angulatum:

abdomen ovatum, planum, longum et latum ac si thorax : alæ longæ

Sp. 26. En. serricornis ? Mas. *Viridis aut æneus, scutellum et abdomen cuprea, antennæ nigræ, pedes nigro-fuscæ, mesopedes pallidiores, alæ limpidæ.*

Encyrtus serricornis ? *Dalman, Kongl. Vetens. Acad. Handl. för är, 1820; Nees ab Ess. Hym. Ich. affin. Monogr. II. 244.*

Encyrtus chalconotus ? *Ditto* *ditto. 232.*

Læte viridis, nitens : gula et os fulva : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ nigræ ; articulus 1^{us}. nigro-viridis : thorax subitus æneo-viridis, cyaneo varius : humeri albi : scutellum cupreum : metathorax nigro-cupreus : abdomen nigro-cupreum, basi micans : oviductus subexertus ; vaginæ nigræ : pedes nigri ; coxæ virides ; genua flava ; tarsi flavi, apice fuscæ ; propedum femora nigro-fusca, tibiæ fusca, tarsi fulvi ; mesopedum femora et tibiæ fulva, apice basique flava : alæ limpidæ ; squamulæ et nervi fulva, hi apice obscuriores. (Corp. long. lin. $\frac{3}{2}$ — $\frac{4}{3}$; alar. lin. 1—1 $\frac{1}{2}$.)

Var. β.—Cyaneo-viridis : capitis vertex postice cupreus : antennæ fusca ; articulus 1^{us}. nigro-viridis ; 2^{us}. niger : abdomen cupreum, basi viride : pro- et metagenua fulva ; mesotibiæ fusca ; metapedium tibiæ nigro-fusca, tarsi fulvi apice fuscæ.

Var. γ.—Protarsi pallide fuscæ : mesopedum femora nigro-fusca, apice flava ; tibiæ fusca : metatarsi fulvi, apice fuscæ.

Var. δ.—Capitis vertex æneus : scutum cyaneo-viride, antice cupreum ; mesopedum femora nigra, apice flava.

Var. ε.—Caput et thorax ænea.

September ; Dorsetshire, Cornwall. Found in August on the coast near Belfast, by Mr. Haliday.

Mas.—Corpus angustum, nitens, scite punctatum, fere glabrum : caput transversum, convexum, thoracis latitudine ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi medios : antennæ filiformes, pilosæ, corpore vix breviores ; articulus 1^{us}. fusiformis, subitus dilatatus ; 2^{us}. parvus, brevi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes longi, æquales, sublineares ; clava fusiformis, acuminata, articulo 8°. multo longior : thorax longi-ovatus fere planus ; mesothoracis scutum transversum ; paraptera non convenientia ; scutellum obconicum : abdomen ovatum, planum, thorace brevius vix angustius.

Sp. 27. En. Anebus. Mas. *Viridis, abdomen cupreum, antennæ nigrae, pedes nigro-fusci, tarsi flavi, alæ limpidae.*

Læte viridis: capitis vertex cupreo varius: oculi et ocelli picei: antennæ nigrae; articulus 1^{us}. viridis: abdomen nigro-cupreum: sexualia fulva: propedes fulvi, femora nigra, tibiæ fusco cinctæ; mesopedes flavi, femora nigra, tibiæ fusco-cinctæ, tarsi flavi apice fulvi; metapedum femora et tibiæ nigra, genua fulva, tarsi flavi apice fusci: alæ limpidae; squamulæ fusca; nervi fulvi, apice fusci. (Corp. long. lin. $\frac{2}{3}$; alar. lin. 1.)

Var. β.—Capitis vertex cupreus: thorax cupreo-viridis.

June; Hampshire, Isle of Wight.

Mas.—Corpus breve, crassum, scabre punctatum, parce pubescens, parum nitens: caput transversum, breve, convexum, thorace paullo latius; vertex latus; frons abrupte declivis: antennæ submoniliformes, pilosæ, corporis longitudine; articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis; 2^{us}. brevis, cyathiformis; 3^{us}. et sequentes ad 8^{us}. longi, æquales, sublineares, discreti; clava longi-ovata, articulo 8°. latior et multo longior: thorax ovatus, altus, fere planus: mesothoracis scutum vix longitudine latius; paraptera non convenientia; scutellum obconicum: abdomen brevi-ovatum, planum, lœve, nitens, fere glabrum, thorace paullo angustius et plus dimidio brevius: pedes longiusculi.

Sp. 28. En. Aralius. Mas. *Viridi-æneus, antennæ fuscæ aut fulvæ, pedes nigro-fuscæ, femora viridia, mesopedes fusco-fulvæ, alæ limpidae.*

Æneo-viridis: caput viride: oculi et ocelli obsure rufi: antennæ nigro-fuscæ; articulus 1^{us}. viridis; 2^{us}. niger: scutellum viridi-æneum: abdomen cupreo-æneum, viridi varium: pro- et metapodus coxae et femora viridia; genua fulva; tibiæ nigrae; tarsi fulvi, apice fusci: mesopodus femora et tibiæ fusca, hæ apice fulvæ; genua flava; tarsi pallide fulvi, apice fulvo-fusci: alæ limpidae; squamulæ et nervi fusca. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{5}{4}$; alar. lin. $\frac{5}{4}$ —1.)

Var. β.—Thorax viridis: scutellum æneo-viride.

Var. γ.—Thorax æneus: caput viridi-æneum: protibiæ nigro-fuscæ, apice fulvæ: mesotarsi flavi, apice fusci: alarum nervi fulvi, apice obscuriores.

Var. ♂.—Antennæ fulvæ ; articulus 1^{us}. viridis ; 2^{us}. niger : scutellum æneum : abdomen nigro-æneum : genua flava ; tarsi pallide fusi : mesopedum tibiæ apice flavæ ; tarsi flavi, apice fusi ; protibiæ nigro-fuscæ : alarum nervi fulvi, apice obscuriores.

September ; near London, Isle of Wight.

Mas.—Corpus breve, crassum, pubescens, subnitens, scite punctatum : caput transversum, breve, convexum, thoracis latitudine ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi mediocres : antennæ filiformes, pilosæ, corporis longitudine ; articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis ; 2^{us}. brevis, cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes longi, lineares, approximati, usque ad 8^{um}. curtantes ; clava fusiformis, acuminata, articulo 8°. multo longior non latior : thorax ovatus, convexus : mesothoracis scutum transversum ; paraptera non convenientia ; scutellum brevi-obconicum : abdomen brevi-ovatum, planum, thorace multo brevius vix angustius.

Sp. 29. En. Teuteus. Mas. *Cyaneo-viridis, abdomen æneum, antennæ nigro-fuscæ, pedes fusi, mesopedes fulvi, alæ limpidæ.*

Cyaneo-viridis : caput nigrum, obscurum, postice æneum : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ nigro-fuscæ ; articulus 1^{us}. basi fulvus : metathorax æneus : abdomen cupreo-æneum, viridi varium : pro-pedes fusi, genua et tarsi pallidiora : mesopedes læti fulvi, tarsi apice obscuriores : metapedes nigro-fusi, genua fulva, tarsi pallide fusi : alæ limpidæ ; squamulæ et nervi pallide fusca. (Corp. long. lin. $\frac{2}{3}$; alar. lin. 1.)

Found near London.

Mas.—Corpus sublineare, pubescens, subnitens, scite punctatum : caput transversum, breve, convexum, thoracis latitudine ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi mediocres : antennæ filiformes, pubescentes, corpore paullo breviores ; articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis ; 2^{us}. cyathiformis, brevis ; 3^{us}. et sequentes ad 8^{um}. longi, lineares, subæquales ; clava fusiformis, articulo 8°. fere duplo longior : thorax longi-ovatus, convexus : mesothoracis scutum transversum ; paraptera non convenientia ; scutellum ob-conicum : abdomen ovatum, planum, thorace brevius.

Sp. 30. En. Aithyia. Mas. *Viridis aut cupreus, antennæ fuscæ, pedes fusi, tarsi pallidiores, alæ limpidæ.*

Viridis : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ fuscæ ; articuli 1^{us}. et

2^{um}. nigri : thorax cupreo-varius : abdomen nigro-cupreum : sexualia fusca : pedes nigro-fusci ; genua fulva ; tarsi pallide fusci ; mesotarsi flavi, apice fusci : alæ limpidæ ; squamulæ et nervi pallide fusca. (Corp. long. lin. $\frac{2}{3}$; alar. lin. 1.)

Var. β.—Caput cupreo varium : thorax omnino cupreus.

Var. γ.—Genua et tarsi flava, hi apice fusci : protarsi fulvi.

July, September ; near London, Cornwall.

Mas.—Corpus crassum, punctatum, pubescens, parum nitens : caput thoracis latitudine, transversum, breve, convexum ; vertex latus ; frons abrupte declivis : oculi mediocres : thorax ovatus, altus, convexus : mesothoracis scutum transversum ; paraptera fere convenientia ; scutellum obconicum : abdomen ovatum, planum, thorace paullo brevius multo angustius ; antennæ longitudine corporis, filiformes, pubescentes, articulus 1^{us}. gracilis, fusiformis ; 2^{us}. subrotundus ; 3^{us}. et sequentes longi, sublineares, usque ad 8^{um}. paullulum curtantes ; clava fusiformes, acuminata, articulo 8^o. multo longior non latior : pedes longi.

Sp. 31. En. Spherus. *Mas. Niger aut viridis, abdomen cupreum, antennæ nigro-fuscæ, pedes nigro-fusci, tarsi pallidiores, alæ albæ.*

Niger : oculi et ocelli picei : antennæ nigro-fuscæ ; articulus 1^{us}. niger : abdomen nitens, lœve, fere glabrum : sexualia fusca : pedes nigro-fusci ; genua fulva ; tarsi pallide fusci : alæ albæ ; squamulæ et nervi fulva. (Corp. long. lin. $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$; alar. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$.)

Var. β.—Pedes fusci ; tarsi flavi, apice obscuriores.

Var. γ.—*Viridis* : antennis articulus 1^{us}. viridis : scutellum cupreо-aeneum : abdomen nigro-cupreum : mesotarsi basi et subtus flavi.

Var. δ.—*Var. γ* similis : antennæ nigro-fuscæ ; articulus 1^{us}. fuscus, basi flavus : scutum viridi-cupreum.

September ; near London, North Wales, Dorsetshire.

Mas.—Corpus longum, angustum, scite squameum, parce pubescens, parum nitens : caput thoracis latitudine, transversum, breve ; vertex convexus ; frons abrupte declivis : oculi mediocres : antennæ subserratae, corporis longitudine ; articulus 1^{us}. fusiformis ; 2^{us}. brevis, cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes ad 8^{um}. latiores, cyathi-

formes, subæquales ; clava fusiformis, articulo 8°. duplo longior : thorax longi-ovatus, planus : mesothoracis scutum ut latum sic longum ; paraptera non convenientia ; scutellum brevi-obconicum : metathorax bene determinatus : abdomen longi-ovatum, depresso basi angustius, thoracis longitudine : pedes sat longi ; metafemora subclavata.

Sp. 32. En. Machæras. Mas. *Cupreus, antennæ fuscæ, pedes fulvo-fusci, femora nigra, alæ limpidae.*

Cupreus : oculi et ocelli picei : antennæ pallide fuscae ; articuli 1^{us}. et 2^{us}. nigro-ænei, hic apice et ille basi fulvi : metathorax nigrocupreus : scutellum et abdomen nigro-cuprea, hoc nitens lave fere glabrum : sexualia fusca : pedes fusci ; coxae et femora nigra, hæ apice albida ; tibiæ basi albidae ; tarsi fulvi ; mesotarsi flavi, apice fusci : alæ limpidae ; squamulae et nervi fulva, hi apud stigma obscuriores. (Corp. long. lin. $\frac{2}{3}$; alar. lin. 1.)

September; on grass in fields, near London.

Fem.—Corpus breve, sublineare, punctatum, nitens, pubescens : caput transversum, breve, convexum, thoracis latitudine ; frons abrupte declivis : antennæ clavatae, graciles, corporis dimidio vix breviores ; articulus 1^{us}. fusiformis, gracilis ; 2^{us}. longi-cyathiformis ; 3^{us}. et sequentes breves, subquadrati, usque ad 8^{us}. late-scentes et curtantes ; clava longi-ovata, articulo 8°. paullo latior et plus duplo longior : thorax ovatus, planus : mesothoracis scutum transversum ; paraptera supra non convenientia ; scutellum brevi-obconicum : abdomen brevi-ovatum, planum, thorace paullo latius vix brevius, subtus convexum, apice acuminatum : oviductus occultus : alæ amplæ.

Mas.—Corpus quam *fem.* angustius : antennæ moniliformes, verticillato-pilosæ, corporis dimido longiores ; articulus 2^{us}. subrotundus, parvus ; 3^{us}. et sequentes ad 8^{us}. discreti, subtrigoni ; clava longi-ovata, articulo 8°. duplo longior non latior : abdomen thorace non latius.

Sp. 33. En. subcupratus. Mas et Fem. *Cupreus, antennæ mari fulvæ fem. fuscæ, pedes flavi, metapedes æneo-fusci, alæ limpidae.*

Encyrtus subcupratus . *Dalman, Kongl. Vetens. Acad. Handl. för år, 1820 ; Nees ab Ess. Hym. Ich. affin. Monogr. II. 252.*

Fem.—*Cupreus* : caput viridi-æneum, subtus viride : oculi et ocelli

obscure rufi : antennæ fuscæ : thorax subtus cyaneo-viridis : abdomen cupreum, lœve, fere glabrum, basi viridi varium : pedes lœte flavi ; coxæ cupræ ; tarsi apice fusci : metapedum femora nigro-ænea, tibiæ nigro-fuscæ apice basique flavæ ; alæ limpidæ, fulvo subtinætae, corporis longitudine ; squamulæ et nervi fulva. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{5}{4}$; alar. lin. $\frac{3}{4}$ —1.)

Mas.—Antennæ fulvæ ; articuli 1^{us}. et 2^{us}. supra fusci.

Var. β.—*Fem.* Abdomen basi omnino viride.

Var. γ.—*Fem.* Caput lœte viride, antice viridi-cyanum, postice viridi-æneum : thorax antice æneo-viridis.

Var. δ.—*Mas.* Thoracis scutum viridi varium.

Var. ε.—*Mas.* Caput et thorax viridia : scutellum cupreum.

April, May, July to September; on grass in woods near London, North Wales, Scotland. Found in Ireland by Mr. Haliday.

Sp. 34. En. coniferæ. (Haliday MSS.) *Mas* et *Fem.* *Viridis aut cupreus, antennæ fulvæ, pedes mari fusi* *fem. flavi, metapedes nigri, alæ limpidæ.*

Fem.—*Viridis*, cupreo-varius : caput antice viridi micans : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ fulvæ ; articuli 1^{us}. et 2^{us}. fusci, apice flavi : mesothoracis scutellum apice cupreum : abdomen lœte cupreum : pedes flavi ; tarsi apice fusci ; protibiae et protarsi fulva ; metafemora et metatibiæ nigra, basi et apice flava : alæ limpidæ ; squamulæ et nervi fulva, hi apice obscuriores.

Var. β.—Scutellum cupreum : abdomen basi viridi-cupreum.

Var. γ.—*Var. β.* similis : caput postice cupreum : scuti discus cupreus.

Var. δ.—Antennis articuli 1^{us}. et 2^{us}. apice fulvi ; 3^{us}. et sequentes fusco-fulvi.

Var. ε.—Antennæ fuscæ : caput et thorax supra cuprea.

Mas.—Cupreus, nitens : oculi et ocelli obscure rufi : antennæ fulvæ ; articuli 1^{us}. et 2^{us}. fusci : abdomen nigro-cupreum : pedes flavi ; coxæ æneæ ; pro- et mesopedum femora et tibiæ nigro-fusca, basi et apice flava : pro- et metatarsi fulvi : metafemora et metatibiæ nigra : alæ limpidæ ; squamulæ et nervi fusca. (Corp. long. lin. $\frac{1}{2}$ — $\frac{5}{4}$; alar. lin. $\frac{3}{4}$ —1 $\frac{1}{4}$.)

Var. β.—Antennis articuli 1^{us}. et 2^{us}. nigri.

September; Dorsetshire, Devonshire. Found in Ireland, by Mr. Haliday.